



## ASST Santi Paolo e Carlo

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER UN POSTO DI DIRIGENTE FARMACISTA DISCIPLINA DI FARMACIA OSPEDALIERA A TEMPO PUBBLICO E INDETERMINATO

### PROVA SCRITTA n 1

n.1 Imipenem-cilastatina-relebactam è indicato:

1. nel trattamento di infezioni, incluse HAP/VAP e batteriemie associate, causate da batteri Gram negativi resistenti ai carbapenemi nei quali vi siano opzioni terapeutiche limitate
2. nel trattamento di pazienti adulti con endocardite infettiva del cuore destro da Staphylococcus aureus
3. nel trattamento di infezioni batteriche acute della cute e della struttura cutanea negli adulti in monosomministrazione

n. 2 Indica quale delle seguenti affermazioni è falsa: Fremanezumab è

1. Un anticorpo monoclonale antagonista del peptide correlato al gene della calcitonina
2. In fascia H, file F tipologia 1
3. Somministrato SC una volta al mese

n. 3 Idarucizumab è

1. Indicato nel trattamento di emorragie potenzialmente fatali in pazienti in terapia anticoagulante con dabigatran
2. Indicato nel trattamento di emorragie potenzialmente fatali in pazienti in terapia anticoagulante con NAO
3. Indicato nel trattamento di emorragie potenzialmente fatali in pazienti in terapia anticoagulante con rivaroxaban

n. 4 Quali farmaci sono indicato per Il trattamento di soggetti adulti con COVID-19 di grado lieve o moderato che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono a maggior rischio di progressione verso forme severe di COVID-19, entro 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi:

1. desametasone
2. tocilizumab
3. molnupinavir

n.5 Nivolumab è indicato per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma a cellule renali avanzato in associazione a

1. Sunitinib
2. Cabozantinib
3. Pazopanib



✓  
RB  
JR

PROVA NON OSTRATIA

9/2/23

Fern Lini



## ASST Santi Paolo e Carlo

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER UN POSTO DI DIRIGENTE FARMACISTA DISCIPLINA DI FARMACIA OSPEDALIERA A TEMPO PUBBLICO E INDETERMINATO

- n. 6 In relazione all'inserimento di eventi avversi nella Nuova Rete di Farmacovigilanza, indica la risposta errata:
1. deve essere segnalato un effetto collaterale che si verifica a seguito di un'esposizione professionale
  2. non deve essere segnalata una overdose di medicinale se non ha provocato una reazione avversa
  3. non deve essere effettuata una segnalazione di farmacovigilanza per una reazione avversa provocata da errore terapeutico, ma un incident report
- n. 7 Una medicazione in Idrogel deve essere utilizzata:
1. Per il riempimento di una lesione cavitaria
  2. Per la pulizia e la rimozione dei detriti di una ulcera necrotica
  3. Per gestire la carica batterica di una ulcera infetta
- n. 8 Farmaci off label ai sensi della legge 94/98: descrivere brevemente le condizioni per poter accedere a tali farmaci.
- n. 9 Per la classe degli inibitori delle JAK, indicare:
- il meccanismo d'azione:
  - se si tratta di molecole biologiche o di sintesi.
  - le patologie in cui vengono impiegati.
- n. 10 Farmaci per il trattamento del diabete mellito di tipo 2 ricompresi nella nota 100, descrivere:
- le classi ed il meccanismo d'azione
  - le limitazioni prescrittive
  - le eventuali indicazioni aggiuntive:



PROVA MON OST RATA

9/2/23

Ismael Silva



## ASST Santi Paolo e Carlo

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER UN POSTO DI DIRIGENTE FARMACISTA DISCIPLINA DI FARMACIA OSPEDALIERA A TEMPO PUBBLICO E INDETERMINATO

### PROVA SCRITTA n 3

n.1 Daptomicina è indicata:

1. nel trattamento di infezioni, incluse HAP/VAP e batteriemie associate, causate da batteri Gram negativi resistenti ai carbapenemi nei quali vi siano opzioni terapeutiche limitate
2. nel trattamento di pazienti adulti con endocardite infettiva del cuore destro da *Staphylococcus aureus*
3. nel trattamento di infezioni batteriche acute della cute e della struttura cutanea negli adulti in monosomministrazione

n. 2 Indica quale delle seguenti affermazioni è falsa: Galcanezumab è

1. Un anticorpo monoclonale antagonista del peptide correlato al gene della calcitonina
2. In fascia A-PHT, file F tipologia 6
3. Somministrato SC una volta ogni 3 mesi

n. 3 Il Fattore VIII della coagulazione del sangue umano Klott è

1. Indicato nel trattamento di emorragie potenzialmente fatali in pazienti in terapia anticoagulante orale
2. Indicato nel trattamento di emorragie potenzialmente fatali in pazienti con Emofilia A
3. Indicato nel trattamento di emorragie potenzialmente fatali in pazienti in terapia anticoagulante con NAO

n. 4 Quali farmaci sono indicato per Il trattamento di soggetti adulti con COVID-19 di grado lieve o moderato che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono a maggior rischio di progressione verso forme severe di COVID-19, entro 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi:

1. Sarilumab
2. Nirmatrelvir-Ritonavir
3. Eparine a basso peso molecolare

n. 5 Avelumab è indicato nel

1. carcinoma a cellule di Merkel metastatico
2. melanoma metastatico
3. prima linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico



PROVA MONO ESTRATTA

9/2/23

Federico Galassi





## ASST Santi Paolo e Carlo

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER UN POSTO DI DIRIGENTE FARMACISTA DISCIPLINA DI FARMACIA OSPEDALIERA A TEMPO PUBBLICO E INDETERMINATO

n. 6 Un trocar operativo è

1. il dispositivo per l'accesso dell'ottica nel pneumoperitoneo durante gli interventi laparoscopici
2. uno strumento per l'impianto dei chiodi endomidollari
3. il dispositivo per l'accesso dello strumentario durante gli interventi laparoscopici

n.7 Ai sensi del nuovo Regolamento sui Dispositivi medici 745/2017, l'uso reiterato di un dispositivo medico off label:

1. può essere autorizzato se viene presentata richiesta al Ministero della Salute per "uso compassionevole"
2. non è mai autorizzato
3. può essere utilizzato ai sensi della legge 94/98

n. 8 Descrivi brevemente le due tipologie di innovatività e cosa comportano per i farmaci che ne hanno il requisito e tipologie File F

n. 9 Per la classe degli inibitori delle JAK, indica:

- il meccanismo d'azione
- se si tratta di molecole biologiche o di sintesi
- le patologie in cui vengono impiegati

n. 10 Farmaci ricompresi nella nota 100, descrivi:

- le classi ed il meccanismo d'azione
- le limitazioni prescrittive
- le eventuali indicazioni aggiuntive

PROVA MON GSTRATE

9/2/23

Ismael Salmi



## ASST Santi Paolo e Carlo

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER UN POSTO DI DIRIGENTE FARMACISTA DISCIPLINA DI FARMACIA OSPEDALIERA A TEMPO PUBBLICO E INDETERMINATO

### PROVA PRATICA N. 2

Paziente di sesso maschile, anni 55 affetto da carcinoma gastrico avanzato. BSA 2, peso 80 Kg in terapia con Ramucirumab nei giorni 1 e 15 ogni 28 giorni, in associazione a Paclitaxel 80 mg/mq nei giorni 1, 8, 15 ogni 28 giorni

- Per il giorno 1, calcolare la dose dei due farmaci, considerando che la posologia prevista per Ramucirumab è pari a 8 mg/Kg e per Paclitaxel è pari a 80 mg/mq
- Descrivere l'allestimento della preparazione indicando il volume di farmaco da prelevare per ottenere il corretto dosaggio, il volume della sacca per la diluizione e la durata o la velocità della somministrazione, sapendo che:

Ramucirumab fiala da 500 mg in 50 ml e da 100 mg in 10 ml, deve essere diluito in 250 ml di NaCl 0.9% e deve essere somministrato con un filtro da 0,2 micron ad una velocità non superiore a 25 mg/min.


Paclitaxel fiala da 300 mg in 50 ml e fiala da 100 mg in 16,7 ml in soluzione concentrata deve essere diluita in NaCl 0,9% per ottenere una concentrazione compresa tra 0,3 e 1,2 mg/ml, infusa con un filtro da 0,2 micron, nell'arco di 90 minuti.

- Descrivere i vantaggi di una preparazione centralizzata dei chemioterapici /antiblastici, i requisiti del laboratorio e i controlli necessari da eseguire per garantire la sterilità dei locali e quindi del prodotto finito

Prove non esatte

09/02/23

Francesca







## ASST Santi Paolo e Carlo

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER UN POSTO DI DIRIGENTE FARMACISTA DISCIPLINA DI FARMACIA OSPEDALIERA A TEMPO PUBBLICO E INDETERMINATO

### PROVA PRATICA N. 1

Paziente di sesso maschile, anni 67 affetto da adenocarcinoma metastatico del pancreas in prima linea. BSA 2, peso 85 Kg in terapia con Abraxane - paclitaxel legato all'albumina formulato in nanoparticelle in associazione a Gemcitabina nei giorni 1, 8, 15 ogni 28 giorni.

- Per il giorno 1, calcolare la dose dei due chemioterapici, considerando che la posologia prevista per Paclitaxel – albumina è pari a 125 mg/mq e per Gemcitabina è 1000 mg/mq
- Descrivere l'allestimento della preparazione indicando il volume di farmaco da prelevare per ottenere il corretto dosaggio, il volume della sacca per la eventuale diluizione e la velocità di somministrazione, sapendo che:

Paclitaxel – albumina 100 mg polvere sterile liofilizzato deve essere ricostituito con NaCl 0,9% per ottenere una concentrazione finale di 5 mg/mL di farmaco e deve essere somministrato con filtro in linea in 30 minuti


Gemcitabina 1 g in soluzione concentrata alla concentrazione di 40 mg/ml deve essere diluita in 250 di NaCl 0,9% e deve essere somministrato in 30 minuti.

- Descrivere i vantaggi di una preparazione centralizzata dei chemioterapici /antiblastici, i requisiti del laboratorio e i controlli necessari da eseguire per garantire la sterilità dei locali e quindi del prodotto finito

*Prone non esatto*

*08/02/23*

*Renzo*






CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI DIRIGENTE FARMACISTA DISCIPLINA FARMACIA OSPEDALIERA, A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO

ASST - Santi Paolo e Carlo - Presidio San carlo il 09/02/2023 alle ore 09:30

## PROVA ORALE N.1

1. Raccomandazione Ministeriale n. 17
2. File F tipologia 4 Regione Lombardia



PROVA NON ESTRATTA

10/02  
2023

Officelli




CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI DIRIGENTE FARMACISTA DISCIPLINA FARMACIA OSPEDALIERA, A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO

ASST - Santi Paolo e Carlo - Presidio San carlo il 09/02/2023 alle ore 09:30

## PROVA ORALE N.3

1. Raccomandazione Ministeriale n.19
2. File F tipologia 6 Regione Lombardia



PROVA NON ESTRATTA  $\Delta$   $\frac{10/02}{2023}$

*Ospedale*

