

Area proporzionale al volume di attività

Dettaglio degli indicatori rappresentativi dell'area clinica

Volume di attività totale delle aree cliniche in esame:

Ente Ospedaliero 7624

Polo Ospedaliero 7624

- Molto Basso
- Basso
- Medio
- Alto
- Molto Alto
- ND

Ospedale S. Carlo Borromeo



Standard di qualità

			MOLTO ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	MOLTO BASSO
Area clinica	Indicatore	Peso	1	2	3	4	5
CARDIOCIRCOLATORIO	Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	30%	≤ 6	6 – 8	8 – 12	12 – 14	> 14
	IMA STEMI: % trattati con PTCA entro 90 minuti	15%	≥ 60	50 – 60	40 – 50	20 – 40	< 20
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	10%	≤ 6	6 – 9	9 – 14	14 – 18	> 18
	By-pass Aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	15%	≤ 1.5		1.5 – 4		> 4
	By-pass totale: volumi di ricoveri	5%	≥ 200		100 – 200		< 100
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	15%	≤ 1.5		1.5 – 4		> 4
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	10%	≤ 1		1 – 3		> 3
NERVOSO	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	75%	≤ 8	8 – 10	10 – 14	14 – 16	> 16
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	25%	≤ 1.5		1.5 – 3.5	3.5 – 5	> 5
RESPIRATORIO	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	100%	≤ 5	5 – 7	7 – 12	12 – 16	> 16
CH. GENERALE	Colecistectomia laparoscopica: volume di ricoveri	30%	≥ 100		50 – 100		< 50
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 giorni	70%	≥ 80	70 – 80	60 – 70	50 – 60	< 50
CH. ONCOLOGICA	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno	16%	≤ 5	5 – 8	8 – 12	12 – 18	> 18
	Intervento chirurgico per TM della mammella: volume di ricoveri	10%	≥ 150	135 – 150	100 – 135		< 100
	Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella	14%	≥ 72	72 – 59	59 – 45	45 – 26	< 26
	Intervento chirurgico per TM polmone: volume di ricoveri	10%	≥ 96	85 – 96	50 – 85	21 – 50	≤ 20
	Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	20%	≤ 0.5		0.5 – 3		> 3
	Intervento chirurgico per TM colon: volume di ricoveri	10%	≥ 50	45 – 50	21 – 45		≤ 20
	Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	20%	≤ 1	1 – 3	3 – 6	6 – 8	> 8
GRAVIDANZA E PARTO	Proporzione di parti con taglio cesareo primario (vol < 1000)	45%	≤ 10	10 – 20	20 – 30	30 – 35	> 35
	Proporzione di parti con taglio cesareo primario (vol ≥ 1000)		≤ 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	> 35
	Parti: volume di ricoveri	25%	≥ 1000		500 – 1000		< 500
	Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso taglio cesareo	15%	> 40	25 – 40	13 – 25	5 – 13	≤ 5
	Proporzione di episiotomie in parti vaginali	15%	≤ 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	> 20
OSTEOMUSCOLARE	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48h	50%	≥ 70	60 – 70	40 – 60	30 – 40	< 30
	Interventi per frattura del collo del femore: volume di ricoveri	5%	≥ 75		50 – 75		< 50
	Intervento di protesi di anca: volume di ricoveri	5%	≥ 100		50 – 100		< 50
	Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	15%	≤ 3		3 – 9		> 9
	Intervento per protesi di ginocchio: volume di ricoveri	10%	≥ 100		50 – 100		< 50
	Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	15%	≤ 3		3 – 9		> 9
NEFROLOGIA	Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	100%	≤ 3.3	3.3 – 7.3	7.3 – 12.4	12.4 – 20.5	> 20.5

Indicatore	N	% Grezza	% Adj	RR	p	RR Prec.	p Prec.
Proporzione di PTCA in STEMI su totale PTCA	295	26.78	-	-	-	0.99	0.922
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 90 minuti dall'accesso nella struttura di ricovero/service	84	58.33	57.19	0.99	0.944	1.48	0.020
STEMI: proporzione di PTCA entro 90 minuti sul totale dei trattati con PTCA entro 12h dall'accesso nella struttura di ricovero/service	65	75.39	74.99	0.98	0.781	1.12	0.362
Arteriopatia degli arti inferiori III e IV stadio: amputazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	15	0.00	-	-	-	-	-
Arteriopatia degli arti inferiori III e IV stadio: rivascularizzazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	15	0.00	-	-	-	-	-
Arteriopatia degli arti inferiori III e IV stadio: mortalità entro 6 mesi dal ricovero	18	16.67	-	-	-	-	-
Embolia polmonare: mortalità a 30 giorni dal ricovero	56	8.93	8.57	0.92	0.863	0.90	0.876
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	181	13.81	12.18	1.49	0.078	1.09	0.809
Mortalità a 1 anno nei sopravvissuti a 30 giorni da Infarto Miocardico Acuto complicato da scompenso cardiaco	40	25.00	-	-	-	-	-
STEMI: Mortalità a 30 giorni	79	7.60	8.47	0.99	0.979	0.53	0.222
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni - con nuove variabili	173	6.94	6.15	0.91	0.835	0.70	0.391
Mortalità a 30 giorni per IMA NSTEMI	86	4.65	3.33	0.77	0.622	0.75	0.664
IMA STEMI: mortalità a 1 anno	73	12.33	15.72	2.66	0.009	1.20	0.720
IMA NSTEMI: mortalità a 1 anno	102	14.71	10.72	1.18	0.579	1.20	0.675
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	53	0.00	-	-	-	-	-
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	237	9.28	9.15	0.98	0.904	1.13	0.668
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	196	11.22	11.50	0.97	0.874	0.98	0.931
Embolia polmonare: riammissioni a 30 giorni dal ricovero	52	9.62	10.03	1.19	0.692	0.94	0.926
Ictus ischemico: mortalità a 1 anno	298	14.43	11.79	0.77	0.114	0.77	0.248
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	361	11.91	11.45	1.25	0.156	0.99	0.955

Indicatore	N	% Grezza	% Adj	RR	p	RR Prec.	p Prec.
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	326	3.37	3.41	0.50	0.018	0.53	0.085
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	226	4.87	5.44	0.60	0.083	0.49	0.037
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	215	14.42	15.73	1.34	0.080	1.00	0.995
Proporzione di colecistectomie laparoscopiche eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui (UO coerente)	305	100.00	-	-	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	401	1.75	1.98	1.04	0.912	1.06	0.943
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	400	1.00	1.09	0.96	0.940	0.47	0.516
Proporzione di colecistectomie laparoscopiche in pazienti con colelitiasi in day surgery/one day surgery	158	76.58	74.71	1.90	0.000	1.10	0.186
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	201	85.57	86.43	1.01	0.779	1.03	0.413
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri ORDINARI con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	201	85.57	86.02	1.01	0.750	1.03	0.426
Intervento chirurgico per tumore cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	107	10.28	9.03	3.28	0.000	1.44	0.593
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	5	0.00	-	-	-	-	-
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	31	9.68	-	-	-	-	-
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	147	4.08	5.83	1.66	0.229	1.70	0.545
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	36	5.56	3.73	2.51	0.309	-	-
Proporzione pazienti sottoposte a ricerca linfonodo sentinella durante ricovero per intervento TM mammella	42	69.05	-	-	-	1.13	0.404
Proporzione pazienti sottoposte a svuotamento ascellare durante ricovero per intervento TM mammella	42	2.38	-	-	-	0.60	0.644
Proporzione pazienti con interessamento linfonodale riscontrato durante ricovero per intervento TM mammella	42	9.52	-	-	-	0.89	0.845
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni	138	10.87	11.52	3.20	0.000	1.56	0.291
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	109	0.00	-	-	-	-	-
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	24	4.17	-	-	-	-	-

Indicatore	N	% Grezza	% Adj	RR	p	RR Prec.	p Prec.
Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui (UO coerente)	50	0.00	-	-	-	-	-
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	51	7.84	9.39	1.85	0.200	0.81	0.753
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella	6	33.33	-	-	-	-	-
Intervento chirurgico per TM mammella: proporzione di interventi conservativi	50	78.00	-	-	-	1.04	0.694
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	46	6.52	7.71	1.67	0.363	0.65	0.599
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni - con nuove variabili	138	10.87	11.29	3.13	0.000	1.51	0.325
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella - con nuove variabili	6	33.33	-	-	-	-	-
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 90 giorni	4	0.00	-	-	-	-	-
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 90 giorni	31	12.90	-	-	-	-	-
Intervento chirurgico di resezione pancreatica per TM: mortalità a 90 giorni	20	20.00	-	-	-	-	-
Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso taglio cesareo	90	6.67	6.83	0.58	0.170	6.74	0.076
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	417	21.58	27.29	1.23	0.038	1.22	0.188
Parto vaginale: ricoveri successivi durante il puerperio	649	0.15	0.14	0.23	0.145	-	-
Parto con taglio cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	315	0.64	0.62	0.59	0.457	-	-
Proporzione di episiotomie nei parti vaginali	312	18.59	19.02	2.10	0.000	1.27	0.179
Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi	7	0.00	-	-	-	-	-
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	115	7.83	7.73	1.65	0.134	1.11	0.836
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48 ore dall'accesso nella struttura di ricovero	121	19.01	18.96	0.31	0.000	0.43	0.000

Indicatore	N	% Grezza	% Adj	RR	p	RR Prec.	p Prec.
Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	90	2.22	1.94	0.60	0.476	1.20	0.856
Intervento di protesi di anca: revisione entro 2 anni dall'intervento	139	1.44	1.41	0.66	0.561	0.21	0.054
Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	15	0.00	-	-	-	-	-
Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro 2 anni dall'intervento	27	0.00	-	-	-	-	-
Intervento di protesi di spalla: riammissioni a 30 giorni	26	7.69	7.60	5.08	0.019	-	-
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	181	2.21	2.74	0.37	0.051	1.67	0.474
Intervento di appendicectomia laparoscopica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	10	0.00	-	-	-	-	-