

Area proporzionale al volume di attività

Dettaglio degli indicatori rappresentativi dell'area clinica


Volume di attività totale delle aree cliniche in esame:

Ente Ospedaliero 7362

Polo Ospedaliero 7362

- Molto Basso
- Basso
- Medio
- Alto
- Molto Alto
- ND

Ospedale S. Paolo



Standard di qualità

			MOLTO ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	MOLTO BASSO
Area clinica	Indicatore	Peso	1	2	3	4	5
CARDIOCIRCOLATORIO	Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	30%	≤ 6	6 – 8	8 – 12	12 – 14	> 14
	IMA STEMI: % trattati con PTCA entro 90 minuti	15%	≥ 60	50 – 60	40 – 50	20 – 40	< 20
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	10%	≤ 6	6 – 9	9 – 14	14 – 18	> 18
	By-pass Aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	15%	≤ 1.5		1.5 – 4		> 4
	By-pass totale: volumi di ricoveri	5%	≥ 200		100 – 200		< 100
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	15%	≤ 1.5		1.5 – 4		> 4
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	10%	≤ 1		1 – 3		> 3
NERVOSO	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	75%	≤ 8	8 – 10	10 – 14	14 – 16	> 16
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	25%	≤ 1.5		1.5 – 3.5	3.5 – 5	> 5
RESPIRATORIO	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	100%	≤ 5	5 – 7	7 – 12	12 – 16	> 16
CH. GENERALE	Colecistectomia laparoscopica: volume di ricoveri	30%	≥ 100		50 – 100		< 50
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 giorni	70%	≥ 80	70 – 80	60 – 70	50 – 60	< 50
CH. ONCOLOGICA	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno	16%	≤ 5	5 – 8	8 – 12	12 – 18	> 18
	Intervento chirurgico per TM della mammella: volume di ricoveri	10%	≥ 150	135 – 150	100 – 135		< 100
	Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella	14%	≥ 72	72 – 59	59 – 45	45 – 26	< 26
	Intervento chirurgico per TM polmone: volume di ricoveri	10%	≥ 96	85 – 96	50 – 85	21 – 50	≤ 20
	Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	20%	≤ 0.5		0.5 – 3		> 3
	Intervento chirurgico per TM colon: volume di ricoveri	10%	≥ 50	45 – 50	21 – 45		≤ 20
	Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	20%	≤ 1	1 – 3	3 – 6	6 – 8	> 8
GRAVIDANZA E PARTO	Proporzione di parti con taglio cesareo primario (vol < 1000)	45%	≤ 10	10 – 20	20 – 30	30 – 35	> 35
	Proporzione di parti con taglio cesareo primario (vol ≥ 1000)		≤ 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	> 35
	Parti: volume di ricoveri	25%	≥ 1000		500 – 1000		< 500
	Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso taglio cesareo	15%	> 40	25 – 40	13 – 25	5 – 13	≤ 5
	Proporzione di episiotomie in parti vaginali	15%	≤ 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	> 20
OSTEOMUSCOLARE	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48h	50%	≥ 70	60 – 70	40 – 60	30 – 40	< 30
	Interventi per frattura del collo del femore: volume di ricoveri	5%	≥ 75		50 – 75		< 50
	Intervento di protesi di anca: volume di ricoveri	5%	≥ 100		50 – 100		< 50
	Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	15%	≤ 3		3 – 9		> 9
	Intervento per protesi di ginocchio: volume di ricoveri	10%	≥ 100		50 – 100		< 50
	Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	15%	≤ 3		3 – 9		> 9
NEFROLOGIA	Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	100%	≤ 3.3	3.3 – 7.3	7.3 – 12.4	12.4 – 20.5	> 20.5

Indicatore	N	% Grezza	% Adj	RR	p	RR Prec.	p Prec.
Proporzione di PTCA in STEMI su totale PTCA	282	23.40	-	-	-	0.96	0.773
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 90 minuti dall'accesso nella struttura di ricovero/service	83	33.74	35.07	0.61	0.001	1.15	0.543
STEMI: proporzione di PTCA entro 90 minuti sul totale dei trattati con PTCA entro 12h dall'accesso nella struttura di ricovero/service	55	50.91	51.61	0.68	0.003	1.06	0.763
Arteriopatia degli arti inferiori III e IV stadio: amputazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	15	33.33	-	-	-	-	-
Arteriopatia degli arti inferiori III e IV stadio: rivascularizzazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	15	33.33	-	-	-	-	-
Arteriopatia degli arti inferiori III e IV stadio: mortalità entro 6 mesi dal ricovero	17	11.77	-	-	-	-	-
Embolia polmonare: mortalità a 30 giorni dal ricovero	92	10.87	9.03	0.97	0.932	0.88	0.785
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	175	9.71	10.40	1.28	0.347	1.35	0.488
Mortalità a 1 anno nei sopravvissuti a 30 giorni da Infarto Miocardico Acuto complicato da scompenso cardiaco	38	13.16	-	-	-	-	-
STEMI: Mortalità a 30 giorni	72	9.72	7.11	0.83	0.648	0.43	0.088
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni - con nuove variabili	159	5.66	4.20	0.62	0.360	0.31	0.009
Mortalità a 30 giorni per IMA NSTEMI	82	1.22	1.10	0.26	0.176	0.12	0.050
IMA STEMI: mortalità a 1 anno	72	8.33	7.56	1.28	0.572	1.71	0.426
IMA NSTEMI: mortalità a 1 anno	98	9.18	10.90	1.20	0.610	1.25	0.672
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	31	0.00	-	-	-	-	-
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	317	13.57	11.86	1.26	0.124	0.98	0.928
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	255	10.20	10.48	0.88	0.504	0.75	0.254
Embolia polmonare: riammissioni a 30 giorni dal ricovero	86	11.63	11.40	1.35	0.327	0.59	0.180
Ictus ischemico: mortalità a 1 anno	75	8.00	6.40	0.42	0.041	0.52	0.203
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	74	8.11	8.66	0.95	0.893	1.31	0.644

Indicatore	N	% Grezza	% Adj	RR	p	RR Prec.	p Prec.
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	70	12.86	13.34	1.94	0.034	1.97	0.204
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	239	8.37	10.09	1.10	0.652	2.22	0.036
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	226	13.27	14.31	1.22	0.248	0.92	0.704
Proporzione di colecistectomie laparoscopiche eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui (UO coerente)	165	98.79	-	-	-	1.00	0.795
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	338	0.59	0.72	0.38	0.168	1.83	0.668
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	338	0.30	0.35	0.31	0.240	-	-
Proporzione di colecistectomie laparoscopiche in pazienti con colelitiasi in day surgery/one day surgery	100	64.00	61.82	1.58	0.000	1.17	0.157
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	122	84.43	84.23	0.98	0.570	1.05	0.301
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri ORDINARI con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	122	84.43	83.77	0.98	0.590	1.05	0.309
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	192	1.04	1.31	1.54	0.542	-	-
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	26	3.85	-	-	-	-	-
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	145	1.38	1.69	0.48	0.311	0.99	0.994
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	54	3.70	4.90	3.30	0.120	-	-
Proporzione pazienti sottoposte a ricerca linfonodo sentinella durante ricovero per intervento TM mammella	94	67.02	-	-	-	0.94	0.504
Proporzione pazienti sottoposte a svuotamento ascellare durante ricovero per intervento TM mammella	94	3.19	-	-	-	2.81	0.345
Proporzione pazienti con interessamento linfonodale riscontrato durante ricovero per intervento TM mammella	94	4.26	-	-	-	0.62	0.448
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni	45	2.22	-	-	-	-	-
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	91	2.20	2.10	3.08	0.132	-	-
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	87	1.15	1.19	0.62	0.638	-	-
Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui (UO coerente)	122	0.00	-	-	-	-	-

Indicatore	N	% Grezza	% Adj	RR	p	RR Prec.	p Prec.
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	73	1.37	1.40	0.28	0.197	0.79	0.836
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella	18	100.00	-	-	-	-	-
Intervento chirurgico per TM mammella: proporzione di interventi conservativi	122	74.59	-	-	-	0.85	0.012
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	79	3.80	3.95	0.85	0.781	1.66	0.529
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni - con nuove variabili	45	2.22	-	-	-	-	-
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella - con nuove variabili	15	100.00	-	-	-	-	-
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 90 giorni	184	1.63	2.09	0.97	0.961	-	-
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 90 giorni	23	4.35	-	-	-	-	-
Intervento chirurgico di resezione pancreatica per TM: mortalità a 90 giorni	25	4.00	-	-	-	-	-
Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso taglio cesareo	155	29.68	30.54	2.59	0.000	1.21	0.329
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	895	16.54	16.73	0.75	0.002	0.82	0.114
Parto vaginale: ricoveri successivi durante il puerperio	1448	0.90	0.88	1.44	0.190	0.54	0.303
Parto con taglio cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	503	0.40	0.39	0.38	0.166	1.31	0.849
Proporzione di episiotomie nei parti vaginali	716	12.01	11.99	1.32	0.006	0.65	0.001
Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi	1	0.00	-	-	-	-	-
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	118	6.78	6.50	1.39	0.363	1.08	0.876
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48 ore dall'accesso nella struttura di ricovero	129	41.09	40.62	0.67	0.000	1.08	0.605
Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	91	4.40	3.91	1.22	0.689	0.76	0.671
Intervento di protesi di anca: revisione entro 2 anni dall'intervento	105	3.81	3.77	1.78	0.240	3.37	0.274

Indicatore	N	% Grezza	% Adj	RR	p	RR Prec.	p Prec.
Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	25	0.00	-	-	-	-	-
Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro 2 anni dall'intervento	33	0.00	-	-	-	-	-
Intervento di protesi di spalla: riammissioni a 30 giorni	6	33.33	-	-	-	-	-
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	159	3.77	4.74	0.65	0.301	0.74	0.562
Intervento di appendicectomia laparoscopica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	6	0.00	-	-	-	-	-